


LE SALIBOURNE

Nom du cours d'eau	Le Salibourne
Affluents	Non
Autres noms connus ou anciens	Non
Longueur lit principal + affluents	278 mètres
Linéaire de dérivations parallèles	Non
Com. Com. Communes concernées	Vallée Dordogne Forêt Bessède Coux et Bigaroque-Mouzens
Masse d'eau	FRFR349B « La Dordogne du confluent du Tournefeuille au confluent de la Vézère »
Statut	Domaine privé
Catégorie piscicole	2 ^{ème} catégorie. Présence ponctuelle de cyprinidés.
Hydrologie (pérenne / assecs)	Pérenne
Présence de zones humides	Non
Source(s) : - origine (captée, ZH, résurgence) - altitude	Résurgence captée dans étang 57 mètres
Confluence avec Dordogne : - continuité ou non - altitude	Bonne continuité 53 mètres
Dénivelé	4 mètres
Orientation	Nord / Sud
Date état des lieux	22/07/2025

Localisation - Salibourne




1. Situation générale

D'une longueur de 278 mètres, le Salibourne est le plus petit des ruisseaux de cette étude. Il prend source depuis une résurgence de type "bulide" captée dans un étang qui alimentait autrefois un moulin, dans la plaine alluviale de la Dordogne. Son écoulement est pérenne.


2. Hydrologie

La source du Salibourne correspond à une résurgence karstique pérenne à débit constant située dans la plaine alluviale de la Dordogne, elle est captée au niveau d'un étang puis rejoint rapidement la Dordogne, son écoulement est parfois influencé par les remontées de nappe alluviale de la rivière ou directement par système "des vases communicants" lors des hautes eaux.



Hydrologie du Salibourne

■ Pérenne
■ Assec estival
■ Assec fréquent



3. Hydromorphologie et lit mineur

L'étang-bief de la source de Salibourne, d'une superficie de 1 300 m², est traversé par le ruisseau sur une longueur de 70 mètres. Le lit mineur rejoint ensuite la Dordogne selon un tracé rectiligne avec un gabarit surcreusé (berges d'une hauteur de 2 mètres) et légèrement surdimensionné en largeur.

Son substrat est limoneux au niveau de l'étang puis devient rapidement plus grossier avec une granulométrie de type galets, correspondant au matelas alluvial de la Dordogne. Aucun colmatage n'a été constaté. Aucun embâcle, seuil ou chute ne perturbe son parcours.

Sa confluence avec la Dordogne permet une très bonne continuité malgré le passage légèrement rétréci par le dalot du pont en pierre, sans grand enjeu toutefois au regard de la faible longueur du ruisseau et d'une faune piscicole assez banale (cyprinidés, essentiellement chevesnes).



Aperçu de la résurgence dans le bief






Le bief-étang de Salibourne



Hydromorphologie - Salibourne





Hydromorphologie (hors dérivation)









Lit mineur du Salibourne : berges hautes d'environ 2 mètres et substrat de type galets




Confluence Salibourne-Dordogne


4. Ouvrages

Seulement deux ouvrages se situent sur ce cours d'eau : l'ancien moulin de Salibourne, ainsi qu'un passage dans un dalot pour la traversée du chemin de la servitude de marchepied de la Dordogne par un petit pont bâti en pierres ; ces ouvrages sont fonctionnels.




Pont bâti juste avant la confluence, malgré un gabarit réduit, des cyprinidés fréquentent le ruisseau lors des montées d'eau de la Dordogne.






5. Berges


Les berges du Salibourne sont bâties en pierres au niveau de l'étang-bief, puis de composition naturelle ensuite, elles se caractérisent surtout par une sur-hauteur d'environ deux mètres. Il n'y a pas de pâturage sur ce ruisseau.






6. Ripisylve


La ripisylve du Salibourne est présente à partir de l'aval de l'ancien moulin. D'une largeur inférieure à 10 mètres sur chaque rive, elle est majoritairement composée de chênes pédonculés et aulnes glutineux, accompagnés de quelques frênes communs, ormes champêtres, prunelliers sauvages, aubépines monogynes et érables négundo à l'approche de la Dordogne. Le lit mineur est dépourvu de végétation aquatique.



Largeur de la ripisylve du Salibourne




Strate dominante du Salibourne




7. Occupation des sols

L'occupation des sols est dominée par des prairies de fauche sur les $\frac{3}{4}$ aval, le quart amont correspond à des pelouses et parcs des propriétés attenantes à l'ancien moulin. Plus en retrait, le contexte est très agricole avec de nombreuses cultures.

Occupation des sols du Salibourne




Occupation des sols du Salibourne



8. Milieux et espèces remarquables

Aucune espèce ou milieu remarquable n'ont été relevés. Le Salibourne est parfois fréquenté par des populations de cyprinidés (gardons, chevesnes, ...) lors des montées d'eau de la Dordogne.

Espèces et milieux remarquables - Salibourne



9. Espèces indésirables

Aucune espèce indésirable constatée.

10. Diagnostic / atouts / limites

Atouts :

- Ruisseau pérenne (résurgence).
- Bonne continuité à la confluence Dordogne (sauf à l'étiage de la rivière).
- Bon substrat en aval du moulin (galets).
- Bonne présence de la ripisylve sur les ¾ aval du ruisseau.
- Présence ponctuelle de cyprinidés.

Limites :

- Ruisseau rectifié et surcreusé en aval sur 68 % du linéaire.
- Bief-étang au fil de l'eau sur le quart amont.
- Absence de zone humide.